

□□□□□□□□□□□□□□ (Yellow fever vaccine)

Written by Administrator

Thursday, 15 November 2018 10:25 - Last Updated Thursday, 15 November 2018 10:31

□□□□□□□□□□□□□□ (Yellow fever vaccine)



YELLOW FEVER VACCINE

โรคไข้เหลืองเกิดจากอะไร

เกิดจาก **เชื้อไวรัสไข้เหลือง (Yellow fever virus)** ซึ่งเป็น RNA virus ชนิดสายเดี่ยวอยู่ในกลุ่ม Flavivirus แพร่เชื้อโดยยุงลาย (*Aedes aegypti*) หรือยุงป่า (*Hemagogus spp.*) ในทวีปอเมริกาใต้

การแพร่กระจายและการติดต่อ

1. การติดเชื้อมีทั้งระหว่างสัตว์จำพวกลิงด้วยกัน
2. การติดเชื้อจากสัตว์มาสู่คน
3. การติดเชื้อมีทั้งระหว่างผู้ป่วยมาสู่คนปกติ

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีน

- ผู้ที่มีอายุ 9 เดือนขึ้นไปที่จะเดินทางเข้าไปหรืออาศัยอยู่ในเขตระบาดของโรคในทวีปอเมริกาใต้และแอฟริกา
- บุคลากรในหึ่งปฏิบัติการที่อาจสัมผัสกับไวรัสไข้เหลืองทั้งทางตรงและทางอ้อม



ชนิดของวัคซีนไข้เหลือง

เป็นวัคซีนชนิด **เชื้อมีชีวิตอ่อนฤทธิ์ (live attenuated)** ซึ่งเตรียมจากเชื้อไวรัสไข้เหลืองสายพันธุ์ 17D ผลิตในไข่ไก่ฟัก ทำเป็นรูปผง (freeze-dried)

ขนาดและวิธีใช้

ขนาด 0.5 mL ฉีดเข้าชั้นใต้ผิวหนัง (subcutaneous) ครั้งเดียว ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้ขนาดเท่ากัน

****การฉีดวัคซีนเพียงครั้งเดียว สามารถภูมิคุ้มกันโรคได้ตลอดชีวิต****

ข้อห้ามใช้

- ทารกอายุต่ำกว่า 6 เดือน เนื่องจากมีรายงานการเกิด meningoencephalitis
- ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้ที่มีประวัติแพ้ไข่อย่างรุนแรง



ไม่แนะนำให้วัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ หรือหญิงให้นมบุตร

ทารกอายุ 6-8 เดือน และผู้สูงอายุ (≥ 60 ปี)

หากจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ระบาดของโรคให้พิจารณาฉีดให้ได้ โดยเฝ้าระวังความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ร่วมด้วย

สามารถฉีดวัคซีนได้ที่ไหนบ้างใน

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วัคซีนโรคเขตร 10 จ.เชียงใหม่

โทร. 053-276364 ต่อ 106

เวลาเปิดทำการในเวลาราชการเท่านั้น

ช่วงเช้า 8.30 น. - 11.30 น.

ช่วงบ่าย 13.00 น. - 15.30 น.

เอกสารที่ต้องเตรียม

Passport ตัวจริงหรือสำเนา

ค่าใช้จ่าย

800 บาท
(ค่าวัคซีน 700 + ค่าบริการ 100 บาท)

ควรฉีดเมื่อไหร่

ก่อนเดินทาง 10 วัน