

Suandok Medication Safety Alert

Issue 1 , June 2020

Castor oil / Polysorbate 80 Infusion reaction

Intranet Only



SMSA
Suandok Medication Safety Alert
Issue 1, June 2020
จัดทำโดย งานบริหารข้อมูลทางเภสัชกรรมและสนับสนุนระบบยา

ระวัง!!! Castor oil derivative/Polysorbate 80 สามารถทำให้เกิด infusion reaction



**Flushing,
Blood pressure change,
Tachycardia**



Urticaria



**wheeze-
bronchospasm,
hypoxemia**



**abdominal pain,
crampy,
vomiting**

Infusion reaction สามารถป้องกันได้จากการให้ Rate และ

รายการยาที่มีส่วนประกอบของ Castor oil derivatives/Polysorbate 80

Castor oil derivatives

Sandimmun® Inj 50 mg/mL (Cyclosporine)

การเจือจางยา: ยา 50 mg (1 mL) ใช้ NSS หรือ D5W 20-100 mL

อัตราเร็วในการบริหารยา: หยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ ใช้เวลา 2-6 ชั่วโมง

Castor oil derivatives

Prograf® IV 5 mg/mL (Tacrolimus)

การเจือจางยา: ใช้ NSS หรือ D5W เจือจางยาให้ได้ความเข้มข้นสูงสุด

อัตราเร็วในการบริหารยา: หยดเข้าหลอดเลือดดำช้าๆ ใช้เวลา 24 ชั่วโมง

Polysorbate 80

Cordarone® Inj 150 mg/3 mL (Amiodarone)

การเจือจางยา: ใช้ D5W กรณีบริหารยามากกว่า 1 ชั่วโมง ทาง p

ไม่ควรเกิน 2 mg/mL หากความเข้มข้นมากกว่า 2 mg/mL ควรบริ

อัตราเร็วในการบริหารยา: the initial rate of infusion should no


ยาเคมีบำบัดชื่อการค้านี้ให้บริหารยาตาม Protocol อย่างเคร่งครัด: Intaxel®

ร่วมด้วยช่วยกัน ป้องกันอาการไม่พึงประสงค์จากยา หากพบอุบัติการณ์ กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 36312 (หน่วยเภสัชสนเทศ) และ

แหล่งข้อมูลการผสมและการบริหารยา


01

Sticker E-MARs



02

ฉลากยา



03

ข้อมูลยาฉีด (เล่มเขียว)



หมายเหตุ cordarone สามารถบริหารยาได้หลายรูปแบบ โดยดูข้อมูลได้จากคู่มือยาฉีดและปุ่มคำแนะนำยาฉีด (ไม่มีข้อมูลใน sticker E-MARs และฉลากยา)