

Suandok Medication Safety Alert

Issue 14 , JUN 2021

Multiple dose

Intranet Only



SMSA
Suandok Medication Safety Alert
Issue 14, June 2021

ยาฉีด Multiple dose ที่เบิกใช้สำหรับผู้ป่วยหลายราย

ยา **multiple dose** คือ ยาที่มีการบรรจุสำหรับใช้ได้นานกว่า 1 ครั้ง และหลังจากเปิดใช้แล้ว หากเก็บไว้ในสภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม จะมีคงมีประสิทธิภาพจนถึงวันเวลาที่กำหนด

ยาฉีด multiple dose ที่เบิกใช้สำหรับผู้ป่วยหลายราย คือ ยา multiple dose ที่เบิกมาบริหารยา 1 หลัวย ต่อผู้ป่วยมากกว่า 1 คน

แนวทางปฏิบัติสำหรับยาฉีด multiple dose

- เมื่อเปิดใช้ยาฉีด multiple dose ครั้งแรก ต้องระบุวันที่และเวลาที่เปิดใช้ รวมทั้งวันหมดอายุทุกครั้ง แล้วนำมาติดที่ขวดยา หรือเขียนในฉลากยาข้างขวด (ดังแสดงในรูป)

วันเปิดใช้.....เวลา.....

วันหมดอายุ.....เวลา.....

- การดูดยา ให้ใช้วิธีบริเวณที่จะแทงเข็มด้วย ethyl alcohol solution 70% v/v และใช้เข็มที่ปราศจากเชื้อเท่านั้นในการดูดยา และปฏิบัติตามหลักการ aseptic technique อย่างเคร่งครัด

จัดทำโดย : คณะทำงานระบบเก็บและสำรองยา

การบริหารจัดการยา

- การเบิกยา:** เบิกในนามของผู้ป่วยหลายรายโดยใส่ชื่อผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วย (เช่นเช่น) ยกเว้น Ketamine inj. ไม่ใส่ชื่อผู้ป่วยหลายรายพร้อมแนบใบเบิกที่รายชื่อผู้ป่วยที่ใช้ตัวออกฤทธิ์ๆ ประเภท2 (Ketamine inj 50 mg/mL 10 mL) และขวดยาเดิมที่ใช้ใบในการเบิกยา
- การบริหารยา:** สามารถบริหารแบบ 1 หลัวย ต่อผู้ป่วยมากกว่า 1 คน โดยให้ระบุวันที่เปิดใช้ครั้งแรก รวมถึงวันหมดอายุทุกครั้ง และเก็บรักษาไว้ในความเย็น ความคงตัวของยาแต่ละชนิด

รายการยาฉีด Multiple Dose ที่เบิกใช้สำหรับผู้ป่วยหลายราย ของ รพ.มหาสารคามเชียงใหม่

รายการยา	ชื่อการค้า
Lidocaine HCl	- Lidocaine HCl® (GPO) inj 1% 20 mL - Lidocaine HCl® (GPO) inj 2% 20 mL
Lidocaine with Adrenaline	- Xylocaine 1% adrenaline® 20 ml (1: 200,000) - Xylocaine 2% adrenaline® 20 ml (1: 200,000)
Heparin	- Heparin Leo® 5,000 IU/mL inj (5๗๕)
Triamcinolone acetonide	- Kanolone IAD® inj (5mL) - Kanolone F® inj 40 mg/mL
Ketamine	- Ketamine inj 50 mg/mL (10mL)