

โรค ลมชัก

โรคลมชักเกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง ทำให้มีอาการชักตามมา พบได้ในเด็กและผู้ใหญ่ เกิดจากหลายสาเหตุ ความผิดปกติในเนื้อสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง, มีก้อนเนื้อผิดปกติ, มีแผลหรือเลือดออกในสมอง ผู้เป็นโรคตับ โรคไต ความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ ยาหรือสารพิษ

อาการ

มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายทันที ถ้าผู้ป่วยยืนหรือนั่งอยู่จะล้มลงและร้อง อาจหยุดหายใจ และหน้าเขียว ผู้ป่วยจะกัดฟันแน่น กำมือตาเบิกกว้าง รูม่านตาขยาย และอยู่นิ่งๆ กินเวลา 30 วินาทีถึง 1 นาที เริ่มเข้าสู่ระยะชัก มีกล้ามเนื้อที่แขนขากระตุกเป็นจังหวะ กลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่อยู่ อาจกัดริมฝีปาก ลิ้นหายใจกระตุกและมีเสียงดัง มีน้ำลายเป็นฟองไหลออกจากปาก



การปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่มีอาการชัก

การช่วยเหลือเบื้องต้น

1. ห้ามนำสิ่งของอุดปากผู้ป่วย
2. พยายามจับผู้ป่วยนอนตะแคง เพื่อไม่ให้น้ำลายอุดกั้นทางเดินหายใจ
3. หาหมอนหรือสิ่งของนุ่มๆวางรองศีรษะ เพื่อป้องกันศีรษะกระแทก
4. ควรปลดเสื้อผ้าให้หลวม ถ้าขณะชักผู้ป่วยใส่แว่นควรถอดออกเพื่อป้องกันการแตก
5. ไม่ต้องพยายามทำให้ผู้ป่วยหยุดชัก
6. โทรแจ้ง **1669** เพื่อขอความช่วยเหลือ 

